



**HAL**  
open science

# Formule de Hasse étendue et relations entre les sommes d'Euler

Marc-Antoine Coppo

► **To cite this version:**

Marc-Antoine Coppo. Formule de Hasse étendue et relations entre les sommes d'Euler. 2010. hal-00499548v1

**HAL Id: hal-00499548**

**<https://univ-cotedazur.hal.science/hal-00499548v1>**

Preprint submitted on 9 Jul 2010 (v1), last revised 22 Dec 2011 (v9)

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Formule de Hasse étendue et relations entre les sommes d'Euler

Marc-Antoine Coppo  
Université de Nice-Sophia Antipolis  
Laboratoire J.A. Dieudonné  
Parc Valrose  
F-06108 Nice Cedex 2

Marc-Antoine.COPPO@unice.fr

Prépublication  
2010

## Résumé

Dans cet article, on expose une identité qui étend naturellement la formule de Hasse pour les valeurs de zêta. La réécriture d'une formule sommatoire d'Ohno permet alors de générer une vaste classe de relations entre les sommes d'Euler.

## Abstract

In this article, we expose an identity which naturally extends the Hasse formula for the zeta values. The rewriting of a formula of Ohno enables to generate a vast class of relations between Euler sums.

**Mathematical Subject Classification (2000) :** 11M06, 11M35.

## 1 Introduction

On sait depuis la seconde moitié du dix-neuvième siècle que la fonction  $\zeta$  de Riemann peut être représentée par la transformée de Mellin normalisée

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} t^{s-1} \frac{e^{-t}}{1 - e^{-t}} dt \quad \text{pour } \Re(s) > 1.$$

Plus généralement, la fonction  $\xi_k$  définie pour  $k \geq 1$  par

$$\xi_k(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} t^{s-1} \frac{e^{-t}}{1 - e^{-t}} \text{Li}_k(1 - e^{-t}) dt$$

où  $\text{Li}_k$  désigne le  $k$ -ième polylogarithme  $\text{Li}_k(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^k}$  est apparue pour la première fois dans [1]. L'intégrale converge pour  $\Re(s) > 0$  et la fonction  $\xi_k$  se prolonge analytiquement dans le plan complexe en une fonction entière de  $s$ . Les valeurs de  $\xi_k$  ont des relations étroites avec les valeurs de  $\zeta$ . Ainsi, on a  $\xi_1(k) = k\zeta(k+1)$  et  $\xi_k(1) = \zeta(k+1)$ . De plus, Ohno a démontré dans [7] la remarquable identité sommatoire suivante

$$\sum_{m=1}^{k-1} \xi_{k-m}(m) = 2(k-1)(1-2^{1-k})\zeta(k)$$

que nous appellerons dans la suite *formule d'Ohno*.

On montre dans cet article que les valeurs de  $\xi_k$  aux entiers positifs peuvent s'exprimer sous la forme suivante

$$\xi_k(m+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{k+1}} P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}),$$

où  $P_m(x_1, \dots, x_m)$  désigne le  $m$ -ième polynôme de Bell modifié défini par la fonction génératrice

$$\exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k \frac{z^k}{k}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} P_m(x_1, \dots, x_m) z^m,$$

et où  $H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}$  sont les nombres harmoniques. Nous appelons cette identité la *formule de Hasse étendue* parce qu'elle prolonge naturellement une représentation déjà connue pour les valeurs de  $\zeta$  dont l'origine remonte à Hasse (cf. [3], [6]). L'intérêt de cette expression de  $\xi_k(m)$  est de permettre une réécriture de la formule d'Ohno sous la forme suivante

$$\begin{aligned} & \sum_{m=1}^{k-3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{k-m}} P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}) \\ &= \left(1 - \frac{1}{k-1} - \frac{1}{2^{k-2}}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} P_{k-2}(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(k-2)}), \end{aligned}$$

ce qui génère une intéressante famille de relations entre les *sommes d'Euler* (cf. [2], [5]). En appliquant cette formule dans les cas les plus simples (*i.e.*  $k=4$  et  $k=5$ ), on obtient en particulier les relations suivantes

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^3} - \frac{5}{24} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^2}{n^2} - \frac{5}{24} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(2)}}{n^2} = 0;$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^2}{n^3} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(2)}}{n^3} - \frac{5}{48} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^3}{n^2} - \frac{5}{16} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n H_n^{(2)}}{n^2} - \frac{5}{24} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(3)}}{n^2} = 0.$$

Enfin, en utilisant une formule de Dilcher (cf. [4]), on montre que

$$P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}) = \sum_{n \geq n_1 \geq \dots \geq n_m \geq 1} \frac{1}{n_1 \dots n_m}$$

ce qui permet notamment de retrouver une autre expression de  $\xi_k(m+1)$  donnée dans [7].

## 2 Valeurs de la fonction $\xi_k$

**Théorème 1.** *Soit*

$$F(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} e^{-t} f(t) t^{s-1} dt$$

une transformée de Mellin normalisée avec :

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (1 - e^{-t})^{n-1}$$

où on suppose que les coefficients  $a_n$  vérifient la condition  $|a_n| = O(\frac{1}{n})$ . Les propriétés suivantes sont alors vérifiées :

- 1) L'intégrale  $F(s)$  converge pour  $\Re(s) > 0$ .
- 2) Si  $m$  est un entier naturel et  $s = m + 1$ , alors :

$$F(m+1) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)})}{n} \quad (1)$$

où  $P_m(x_1, \dots, x_m)$  désigne le  $m$ -ème polynôme de Bell modifié défini par la fonction génératrice :

$$\exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k \frac{z^k}{k}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} P_m(x_1, \dots, x_m) z^m$$

et où  $H_n^{(m)} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^m}$ .

*Démonstration.* Par hypothèse, il existe une constante  $C > 0$  et un entier  $N \geq 1$  tels que pour tout  $t \geq 0$ , on a :

$$\sum_{n=N}^{\infty} |a_n| (1 - e^{-t})^{n-1} \leq C \sum_{n=N}^{\infty} \frac{(1 - e^{-t})^{n-1}}{n} \leq C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - e^{-t})^{n-1}}{n} = \frac{Ct}{1 - e^{-t}}$$

ce qui assure la convergence de l'intégrale et autorise la permutation de  $f$  et  $\sum$  :

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^{+\infty} e^{-t} (1 - e^{-t})^{n-1} \frac{t^{s-1}}{\Gamma(s)} dt.$$

La formule (1) résulte alors du lemme qui suit. □

**Lemme 1.**

$$\int_0^{+\infty} e^{-t}(1-e^{-t})^{n-1} \frac{t^m}{m!} dt = \frac{P_m(H_n, \dots, H_n^{(m)})}{n} \quad (2)$$

*Démonstration.* Pour  $a > 0$  et  $b > 0$ , on part de la classique relation d'Euler :

$$B(a, b) = \int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1} du = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

En posant :  $u = e^{-t}$ ,  $a = 1 - z$  et  $b = n + 1$ , on obtient :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t}(1-e^{-t})^n e^{tz} dt = \frac{n!}{(1-z)(2-z)\dots(n+1-z)}.$$

D'autre part, on a aussi

$$\begin{aligned} \frac{n!}{(1-z)(2-z)\dots(n+1-z)} &= \frac{n!}{(n+1)!} \times \prod_{j=0}^n \left(1 - \frac{z}{j+1}\right)^{-1} \\ &= \frac{1}{(n+1)} \times \exp\left(-\sum_{j=0}^n \log\left(1 - \frac{z}{j+1}\right)\right) \\ &= \frac{1}{(n+1)} \times \exp\left(\sum_{j=0}^n \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k(j+1)^k}\right) \\ &= \frac{1}{(n+1)} \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} H_{n+1}^{(k)} \frac{z^k}{k}\right) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{P_m(H_{n+1}^{(1)}, \dots, H_{n+1}^{(m)})}{n+1} z^m. \end{aligned}$$

□

**Exemple 1.**

$$P_0 = 1; P_1(H_n) = H_n; P_2(H_n, H_n^{(2)}) = \frac{(H_n)^2}{2} + \frac{H_n^{(2)}}{2};$$

$$P_3(H_n, H_n^{(2)}, H_n^{(3)}) = \frac{(H_n)^3}{6} + \frac{H_n H_n^{(2)}}{2} + \frac{H_n^{(3)}}{3}.$$

En appliquant le théorème précédent avec  $a_n = \frac{1}{n^k}$ , c'est à dire pour la fonction :

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-e^{-t})^{n-1}}{n^k} = \frac{\text{Li}_k(1-e^{-t})}{1-e^{-t}},$$

on obtient alors immédiatement le corollaire suivant :

**Corollaire 1.** Soit  $k$  un entier  $\geq 1$ . L'intégrale :

$$\xi_k(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\text{Li}_k(1 - e^{-t})}{1 - e^{-t}} t^{s-1} dt$$

converge pour  $\Re(s) > 0$ . On a :

$$\xi_k(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} \int_0^{+\infty} e^{-t} (1 - e^{-t})^{n-1} \frac{t^{s-1}}{\Gamma(s)} dt.$$

En particulier, si  $m$  est un entier naturel et  $s = m + 1$ , alors :

$$\xi_k(m+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{k+1}} P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}) \quad \text{avec} \quad H_n^{(m)} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^m}. \quad (3)$$

**Remarque 1.** Pour  $k = 1$ , on a  $\text{Li}_1(1 - e^{-t}) = t$ . Il en résulte que :

$$\xi_1(s) = \int_0^{+\infty} e^{-t} \left( \frac{t}{1 - e^{-t}} \right) \frac{t^{s-1}}{\Gamma(s)} dt = s\zeta(s+1).$$

Dans ce cas, l'identité (3) n'est pas autre chose que la représentation des valeurs de la fonction zêta connue sous le nom de *formule de Hasse* pour  $\zeta$  (cf. [3], [6]) :

$$(m+1)\zeta(m+2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}).$$

Par exemple, pour  $m = 1$ , on retrouve la célèbre formule d'Euler (cf. [2], [5]) :

$$2\zeta(3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^2}.$$

**Exemple 2.**

$$\xi_{k-1}(1) = \zeta(k);$$

$$\xi_{k-1}(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^k} = \frac{1}{2}(k+2)\zeta(k+1) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{k-2} \zeta(j+1)\zeta(k-j);$$

$$\xi_{k-1}(3) = \frac{1}{2} \left[ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^2}{n^k} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(2)}}{n^k} \right];$$

$$\xi_{k-1}(4) = \frac{1}{6} \left[ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^3}{n^k} + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n H_n^{(2)}}{n^k} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(3)}}{n^k} \right];$$

$$\xi_{k-1}(5) =$$

$$\frac{1}{24} \left[ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^4}{n^k} + 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^2 H_n^{(2)}}{n^k} + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n^{(2)})^2}{n^k} + 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n H_n^{(3)}}{n^k} + 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(4)}}{n^k} \right].$$

### 3 Application aux sommes d'Euler

En réécrivant à présent la *formule d'Ohno* (cf. [7] Proposition 2) :

$$\sum_{m=1}^{k-1} \xi_{k-m}(m) = 2(k-1)(1-2^{1-k})\zeta(k)$$

grâce à la formule de Hasse étendue (3) précédente, et en prenant en compte le fait que  $\xi_1(k-1) + \xi_{k-1}(1) = k\zeta(k)$ , on obtient alors la formule suivante qui génère une famille de relations entre les sommes d'Euler :

**Corollaire 2.** *Pour  $k \geq 4$  et  $m \geq 1$ ,*

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{k-3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{k-m}} P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}) \\ = \left(1 - \frac{1}{k-1} - \frac{1}{2^{k-2}}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} P_{k-2}(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(k-2)}). \end{aligned} \quad (4)$$

**Exemple 3.**

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^3} - \frac{5}{24} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^2}{n^2} - \frac{5}{24} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(2)}}{n^2} &= 0; \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^2}{n^3} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(2)}}{n^3} - \frac{5}{48} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^3}{n^2} - \frac{5}{16} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n H_n^{(2)}}{n^2} - \frac{5}{24} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(3)}}{n^2} &= 0; \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^5} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^2}{n^4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(2)}}{n^4} + \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^3}{n^3} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n H_n^{(2)}}{n^3} + \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(3)}}{n^3} \\ - \frac{59}{1920} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^4}{n^2} - \frac{59}{320} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n)^2 H_n^{(2)}}{n^2} - \frac{59}{640} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(H_n^{(2)})^2}{n^2} - \frac{59}{240} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n H_n^{(3)}}{n^2} - \frac{59}{320} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n^{(4)}}{n^2} &= 0. \end{aligned}$$

**Remarque 2.** En développant  $(1 - e^{-t})^{n-1}$  par la formule du binôme dans (2), on obtient l'identité suivante

$$P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} \frac{1}{k^m}.$$

Par ailleurs, par la formule de Dilcher (cf. [4] Corollaire 3), on a aussi

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} \frac{1}{k^m} = \sum_{n \geq n_1 \geq \dots \geq n_m \geq 1} \frac{1}{n_1 \dots n_m},$$

d'où, par transitivité,

$$P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}) = \sum_{n \geq n_1 \geq \dots \geq n_m \geq 1} \frac{1}{n_1 \dots n_m}. \quad (5)$$

Ceci permet de retrouver la représentation de  $\xi_k(m+1)$  donnée dans [7] :

$$\xi_k(m+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{k+1}} P_m(H_n, H_n^{(2)}, \dots, H_n^{(m)}) = \sum_{n \geq n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_m \geq 1} \frac{1}{n^{k+1} n_1 n_2 \dots n_m}.$$

## 4 Appendice

On montre que la formule (5) est en fait un cas particulier d'une formule plus générale. Pour cela, on considère un produit infini convergent

$$Q(z) = \prod_{n \geq 1} (1 - a_n z).$$

L'inverse de ce produit peut se développer en

$$\frac{1}{Q(z)} = \frac{1}{\prod_{n \geq 1} (1 - a_n z)} = \prod_{n \geq 1} (1 + a_n z + a_n^2 z^2 + \dots) = \sum_{m \geq 0} \left( \sum_{n_1 \leq \dots \leq n_m} a_{n_1} \dots a_{n_m} \right) z^m. \quad (6)$$

Par ailleurs, on a  $\log(Q(z)) = \sum_{n \geq 1} \log(1 - a_n z)$ . D'où

$$\partial \log(Q(z)) = \sum_{n \geq 1} \frac{-a_n}{1 - a_n z} = - \sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 0} a_n^{k+1} z^k = - \sum_{k \geq 0} z^k \sum_{n \geq 1} a_n^{k+1}.$$

Par conséquent,

$$- \log(Q(z)) = \sum_{k \geq 0} \frac{z^{k+1}}{k+1} \sum_{n \geq 1} a_n^{k+1} = \sum_{k \geq 1} \sum_{n \geq 1} a_n^k \frac{z^k}{k}.$$

En posant  $S_k(a) = \sum_{n \geq 1} a_n^k$ , on en déduit que

$$\frac{1}{Q(z)} = \exp\left(\sum_{k \geq 1} S_k(a) \frac{z^k}{k}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} P_m(S_1(a), \dots, S_m(a)) z^m.$$

Par identification avec (6), on obtient la formule générale :

$$\sum_{n_1 \leq \dots \leq n_m} a_{n_1} \dots a_{n_m} = P_m(S_1(a), \dots, S_m(a)). \quad (7)$$

En posant,  $a_n = 1/n$  pour  $1 \leq n \leq N$  et  $a_n = 0$  pour  $n > N$ , on retrouve (5).



## Références

- [1] T. Arakawa, M. Kaneko, *Multiple zeta values, Poly-Bernoulli numbers and related zeta functions*, Nagoya Math. J., **153** (1999), 189-209.
- [2] J. Choi, H.M. Srivastava *Explicit evaluation of Euler and related sums*, The Ramanujan J., **10** (2005), 51-70.
- [3] M-A. Coppo, *Nouvelles expressions des formules de Hasse et de Hermite pour la fonction zêta d'Hurwitz*, Expositiones Math., **27** (2009), 79-86.
- [4] K. Dilcher, *Some  $q$ -series identities related to divisors functions*, Discrete Math., **145** (1995), 83-93.
- [5] L. Euler, *Meditationes circa singulare serierum genus*, (1775), Opera Omnia I-15, 217-267.
- [6] H. Hasse, *Ein Summierungsverfahren für die Riemannsche  $\zeta$ -Reihe*, Mathematische Zeitschrift, **32** (1930), 458-464.
- [7] Y. Ohno, *Sum relations for multiple zeta values*, in Zeta functions, Topology, and Quantum Physics, Dev. Math. **14**, 131-144, Springer, New York, 2005.